

**Očkovanie s cieľom aktívne navodiť obranyschopnosť proti týmto infekčným chorobám:**

**osýpky + rubeola + mumps – 1.dávka**

/vakcína obsahuje živé, oslabené vírusy osýpok, mumpsu a rubeoly/

**Očkovacia látka:** MMR-VAX PRO, Sanofi-Aventis, MSD – plne hradená zo zdrav. poistenia  
PRIORIX, GSK, Belgicko – plne hradená zo zdravotného poistenia

**Spôsob podania:** 1 vpichom hlboko podkožne, resp. do svalu v oblasti deltoidného svalu ramena

**Schéma základného očkovania:** 1 dávka od 1.dňa 15.mesiaca života – najneskôr do 18.m.

**Potreba preočkovania:** v 5.roku veku /medzi.4.-5. narodeninami/ dietľaťa

**Očakávateľné , bežné reakcie po očkovani:**

- opuch, bolestivosť a začervenanie v mieste vpichu sa môže objaviť skôr ako včasné reakcie nižšie uvedené reakcie sa môžu vyskytnúť zvyčajne na **7.-12. deň** po očkovani
  - výstup teploty , prejavy ako pri ľahšom infekte dýchacích ciest
  - vyrážka na koži
  - opuch slinnej žľazy
  - opuch lymfatických uzlín

- ak sa príznaky rozvinú, odporúčame kontaktovať očkujúceho lekára kvôli zhodnoteniu stavu, ošetrenie však obvykle zvládne rodič symptomatickými liekmi. Spravidla do týždňa sa príznaky zmierňujú a ustupujú. Po preočkovani v 11. roku života je výskyt uvedených reakcií minimálny.

**Alergická reakcia po očkovani:** zriedkavá - nedá sa dopredu odhadnúť

- ak by k nej došlo – zvyčajne je **to do 30 minút od podania** očkovacej látky - prejavy sú **svrbivá vyrážka, opuch uší, očí a tváre, st'ažené dýchanie a hltanie** - nutné je vyhľadať neodkladnú lekársku pomoc !! - v očkovani ďalších dávok sa už nesmie pokračovať

**Vystupňované reakcie po očkovani:** vyskytujú sa veľmi vzácne (príčinou je neprimeraná reakcia imunitného systému)

- horúčka vyššia ako 40 st.C
- výrazná reakcia - začervenanie a opuch v mieste vpichu
- vystupňované reakcie popísané vyššie
- prípadne neurologické príznaky

Tieto reakcie je potrebné dôkladne posúdiť, podliehajú hláseniu, spravidla sa riešia v spolupráci s tímom špecialistov a podanie ďalších dávok vakcíny, po ktorej vznikli uvedené príznaky sa individuálne zvažuje.

Po každom očkovaní

**je potrebné zotrvať 30 min. v čakárni ambulancie očkujúceho lekára.**