

**Očkovanie s cieľom aktívne posilniť obranyschopnosť proti týmto infekčným chorobám:**

**osýpky + rubeola + mumps – 2.dávka – po základnom očkovaní v 15.mes  
veku dieťaťa**

/vakcína obsahuje živé, oslabené vírusy osýpok, mumpsu a rubeoly/

2.dávku MMR vakcíny podávame deťom v 5.roku veku /medzi.4.-5. narodeninami/ dieťaťu .

Deti narodené do 31.12.2015 dostanú 2.dávku vakcíny MMR v 11.roku života /medzi 10.-11.narodeninami/ tak ako to platilo do 31.12.2019.

Očkovanie sa považuje podaním 2.dávky za ukončené.

**Očkovacia látka:** MMR-VAX PRO, výrobca Sanofi-Aventis,MSD – plne hrazená zo zdrav. poistenia  
PRIORIX, výrobca GSK, Belgicko – plne hrazená zo zdravotného poistenia

**Spôsob podania:** 1 vpichom hlboko podkožne, resp. do svalu v oblasti deltoidného svalu ramena

**Očakávateľné , bežné reakcie po očkovaní:**

- opuch, bolestivosť a začervenanie v mieste vpichu sa môže objaviť skôr ako včasná reakcia nižšie uvedené reakcie sa môžu vyskytnúť zvyčajne na **7.-12. deň** po očkovaní
- výstup teploty , prejavy ako pri ľahšom infekte dýchacích ciest
- vyrážka na koži
- opuch slinnej žľazy
- opuch lymfatických uzlín

- ak sa príznaky rozvinú, odporúčame kontaktovať očkujúceho lekára kvôli zhodnoteniu stavu, ošetrovanie však obvykle zvládne rodič symptomatickými liekmi. Spravidla do týždňa sa príznaky zmierňujú a ustupujú. Po preočkovaní 2.dávkou je výskyt uvedených reakcií minimálny.

**Alergická reakcia po očkovaní:** zriedkavá - nedá sa dopredu odhadnúť

- ak by k nej došlo – **zvyčajne je to do 30 minút od podania** očkovacej látky - prejavy sú **svrbivá vyrážka, opuch uší, očí a tváre, sťažené dýchanie a hltanie** - nutné je vyhľadať neodkladnú lekársku pomoc !! - v očkovaní ďalších dávok sa už nesmie pokračovať

**Vystupňované reakcie po očkovaní:** vyskytujú sa veľmi vzácné (príčinou je neprimeraná reakcia imunitného systému)

- horúčka vyššia ako 40 st.C
- výrazná reakcia - začervenanie a opuch v mieste vpichu
- vystupňované reakcie popísané vyššie
- prípadne neurologické príznaky

Tieto reakcie je potrebné dôkladne posúdiť, podliehajú hláseniu, spravidla sa riešia v spolupráci s tímom špecialistov a podanie ďalších dávok vakcíny, po ktorej vznikli uvedené príznaky sa individuálne zvažuje.

Po každom očkovaní  
**je potrebné zotrvať 30 min. v čakárni ambulancie očkujúceho lekára.**